Étude d'une Collection d'Oiseaux de l'Equateur, donnée au Muséum par M. Clavery,

par M. J. Berlioz.

(*Suite.*)

Trochilidés.

L'importante série de Trochilidés renferme, à côté des espèces ordinaires de la région de Quito, deux espèces beaucoup plus rares, propres à l'Orient équatorien, le *Campylopterus Villavicencio* et le *Phlogophilus hemileucurus :*

Phaetornis superciliosa Moorei Lawr. — 2 ♂ ad. : San José.

Cette race représente dans le haut bassin de l'Amazone une espèce polymorphe, répandue dans tout le nord de l'Amérique du Sud.

Pygmornis griseogularis (Gould). — ♂ ad. : Rio Suno.

Sœpiopterus (= *Campylopterus*) *Villavicencio* (Bourc.). — ♂ ad. : San José.

Une des gemmes de cette collection; ce superbe Colibri, toujours assez rare dans les Musées, n'est connu que de l'Équateur oriental (bassin du Rio Napo, affluent de l'Amazone) et se distingue aisément de la plupart des autres Campyloptères par son bec allongé et presque droit.

Petasophora iolata (Gould). — 5 ♂ et 2 ♀ ad. : Cerro Mojanda; Vallée de Tumbaco.

Espèce purement andine, des plus communes en Équateur.

Prasitis melanorhynchus (Gould). — 2 ♂, 1 ♀ ad. : Vallée de Tumbaco.

Thalurania nigrofasciata (Gould). — 3 ♂ ad. : San José.

Cette espèce répandue dans tout le haut bassin de l'Amazone, ne se trouve, en Équateur, que dans la région orientale.

Adelomyia melanogenys (Fraser). — 3 ♂, 1 ♀ : Aluguincho.

Phlogophilus hemileucurus Gould. — ? ♂, 2 ♀ ad. : San José.

Ce petit Oiseau-Mouche, aux couleurs peu brillantes, représente un type assez isolé, par ses caractères très particuliers, dans l'immense groupe des Trochilidés. Il est exclusivement cantonné dans le bassin amazonien de

l'Équateur, région en dehors de laquelle il n'a jamais été trouvé. Les deux sexes possèdent un plumage à peu près semblable, gynémorphe.

Oreotrochilus Chimborazo Jamesoni Jard. — 3 ♂ et 1 ♀ ad. : Cerro Antisana.

Espèce bien connue, propre aux hautes altitudes de l'Équateur.

Patagona gigas (Vieill.). — 1 ♂ ad., 1 ♂ juv., 1 ♀ : V. de Tumbaco.

L'Équateur est la limite septentrionale de cet Oiseau, propre aux hautes régions andines et dont l'habitat s'étend au sud jusqu'au Chili central.

Aglœactis cupreipennis (Bourc.). — 4 ♂ ad., ?2 ♀ : Cerro Mojanda; Papallacta.

Pterophanes cyanopterus (Fras.). — 2 ♂ imm. : Cerro Mojanda.

Calligenia Lutetiæ (Del. et Bourc.). 1 ♂ ad., 2 ♀? : Aluguincho, — 2 ♂ ad. : Papallacta.

Un des Oiseaux-Mouches les plus abondants dans les Andes, autour de Quito. — Les spécimens du versant oriental avaient été rapportés par Goodfellow à une race particulière sous le nom de *C. L. Hamiltoni*, dont la localité typique serait Papallacta. En réalité, les deux spécimens que nous signalons ici de cette même localité ne diffèrent pas des autres et nous nous rangeons tout à fait à l'avis de Chapman (*Bird-Life in Ecuador*, 1926, p. 305), qui considère comme inexistante cette distinction subspécifique.

Bourcieria torquata (Boiss.). — 2 ♂ ad. et imm. : Huila.

Espèce propre à la Colombie et à l'Équateur, mais, en ce dernier pays, seulement dans la Cordillère orientale.

Bourcieria fulgidigula Gould. — 2 ♂, 2 ♀ ad. : Aluguincho.

Très voisine de la précédente, cette espèce la remplace sur le versant occidental des Andes de l'Équateur.

Docimastes ensifer (Boiss.). — 4 ♂ ad. et imm. : Aluguincho; Cerro Mojanda; Papallacta.

Heliotrypha exortis (Fraser). — 2 ♂ ad. : Huila.

Eriocnemis Luciani (Bourc.). — 2 ♂, 2 ♀ ad. : Cerro Mojanda.

Psalidoprymna Victoriæ (Bourc.). — 3 ♂, 1 ♀ : Cerro Mojanda; V. de Tumbaco.

Psalidoprymna gracilis (Gould). — 3 ♂, 3 ♀ : Cerro Mojanda; V. de Tumbaco.

Metallura tyrianthina (Lodd.). — 4 ♂, 3 ♀ : Cerro Mojanda; V. de San Pedro Tingo; Huila.

Chalcostigma Stanleyi (Bourc.). — ♂ presque ad. : Cerro Antisana.

Espèce tout à fait localisée, comme les *Oreotrochilus*, dans les hautes altitudes, au voisinage des neiges; ne se trouve que dans l'Équateur et le nord du Pérou.

Myrtis Fannyæ (Less.). — 2 ♂, 1 ♀ ad. : V. de Tumbaco.

Dans le nord de l'Équateur, cet Oiseau-Mouche, qui se retrouve aussi au Pérou sur les deux versants des Andes, est une des espèces les plus caractéristiques des Andes occidentales seulement,

Acestrura Mulsanti (Bourc.). — 2 ♂, 1 ♀ ad. : V. de Tumbaco.

Pteroptochidés.

Scytalopus fuscus latrans Hellm (=*S. magellanicus* pars., auct). — 1 ♂ et 1 ♀ ad., 2 ♀? imm. : Cerro Mojanda.

D'après les caractères indiqués par Hellmayr (*Cat. of Birds of Amer.*, III, 1924, p. 11), il nous semble impossible de séparer spécifiquement cette race nord-andine de la forme *S. fuscus* typique, des Andes méridionales. D'ailleurs les deux spécimens ♀, qui nous signalons ici comme vraisemblablement immatures, présentent des caractères de coloration les rapprochant de cette dernière : coloration générale d'un gris un peu plus pâle, avec des traces mal définies de bandes roussâtres vers la région anale, tandis que les adultes sont uniformément d'un gris foncé.

Scytalopus femoralis micropterus (Scl.) [=*S. analis*, auct.]. — 1 ♀ : Aluguincho.

Espèce propre également aux Andes septentrionales. Le seul spécimen que nous signalons ici a le dessus du corps fortement teinté de brun, selon le caractère distinctif donné pour la race de Colombie et de l'Équateur.

Acropternis orthonyx infuscata Salv. et Fest. — ♂ ad. : Pilon.

Conopophagidés.

Conopophaga aurita occidentalis Chubb. — 1 ♂, 2 ♀ ad. : Rio Suno.

Ces spécimens, qui sont caractéristiques de la race du haut bassin de l'Amazone, n'en accusent que davantage la faible différence de teinte qui sert à distinguer celle-ci de la race typique, du Bas-Amazone et des Guyanes.

Corythopis torquata sarayacuensis Chubb. — ♂ ad. : Rio Suno.

Ce curieux Oiseau est également un représentant de la faune amazonienne, dont la race andine est fort peu différente du type.

Formicariidés.

Cette importante famille est, comme la précédente, abondamment représentée surtout dans le bassin de l'Amazone, les Guyanes et le Brésil. Aussi bien les Oiseaux que nous signalons ici sont-ils tous, — à l'exception des *Grallaria*, plus spécialement adaptés aux forêts andines de moyenne altitude, — des habitants des basses forêts humides, à climat

chaud, de l'est de l'Équateur. La plupart d'entre eux y représentent des espèces possédant une aire de dispersion considérable et dont chacune est connue par plusieurs races géographiques, souvent d'ailleurs fort peu différentes les unes des autres : le haut bassin de l'Amazone, comprenant les territoires de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou arrosés par ce fleuve et ses affluents les plus occidentaux (Rio Napo, etc.) ainsi que les confins du Vénézuéla et du Brésil, peut être considéré à ce titre comme une région assez particularisée, possédant ses types spécifiques et subspécifiques propres, dont la série mentionnée ci-après donne un aperçu significatif.

Cymbilaimus lineatus intermedius (Hart. et Goods.). — 2 ♂, 1 ♀ ad. : San José; Rio Suno.

Thamnistes anabatinus æquatorialis, Scl. — ♀ ad. : San José.

Myrmotherula ornata saturata (Chapm.). — ♀ ad. : San José.

Myrmotherula axillaris melæna (Scl.). — ♂ ad. : Rio Suno.

Espèce bien caractérisée par les longues touffes de plumes blanches qui ornent les flancs.

Myrmotherula longipennis Pelz. — ♂ et ♀ ad. : Rio Suno.

Myrmotherula Menetriesi pallida Berl. et Hart. — ♂ et ♀ ad. : Rio Suno; San José.

Cette espèce et la précédente appartiennent au groupe particulièrement complexe des *Myrmotherula* à plumage presque uniformément gris chez le ♂ : chez *M. longipennis*, la gorge est noire, comme chez *M. Menetriesi* typique, mais chez la race *pallida*, la gorge est grise comme le dessous du corps. Les femelles des deux espèces sont à peine distinctes l'une de l'autre.

Microrhopias (= Formicivora) quixensis (Corn.). — ♂ ad. : Rio Suno.

Cercomacra serva (Scl.). — ♂ ad. : Rio Suno.

L'identification de ce spécimen laisse place à quelque doute, car la queue fait presque entièrement défaut : elle est réduite à deux rectrices latérales, noires avec une très petite tache blanche au sommet. Mais par ses proportions, ainsi que par son plumage noirâtre, marqué de blanc sur le dos et les couvertures alaires, il nous semble bien devoir être rapporté à cette espèce, propre au versant oriental des Andes, de l'Équateur à la Bolivie.

Myrmoborus myotherinus (Spix). — ♂ ad. : Rio Suno.

Hypocnemis cantator peruviana Tacz. — ♀ : Rio Suno.

Sclateria schistacea subplumbea (Scl. et Salv.). — ♂ ad. : San José.

Cette espèce, que ses affinités énigmatiques ont fait ranger autrefois parmi les *Dysithamnus*, est difficile à caractériser; le mâle paraît surtout distinct par les très petites taches blanches des tectrices alaires, réduites à

un point apical et non à une bordure, le reste du plumage étant d'un gris sombre uniforme.

Formicarius analis Zamorae Chapm. — ♂ ad., ♂ imm., 2 ♀ ad. : San José; Rio Suno.

Race propre à l'est de l'Équateur, d'une espèce très répandue en Amérique tropicale. Le spécimen que nous considérons comme immature, se distingue des autres, — cas d'ailleurs très général dans tout ce groupe d'Oiseaux, — par la gorge blanchâtre variée de noir et la teinte d'un gris moins pur, plus teintée de brun, du dessous du corps.

Hylophylax nævia Theresæ (Des Murs). — ♂ et ♀ ad. : San José.

Cet Oiseau est un des plus remarquables de la famille par l'ornementation compliquée de son plumage. La race haute-amazonienne, à laquelle appartiennent ces spécimens, se distingue nettement de la race typique guyanaise par la teinte fauve pâle et non blanche de ses taches.

Myrmornis torquata (Bodd.) [=*Rhopoterpe t.*, auct.]. — ♀ ad. : Rio Suno.

Les trois espèces suivantes de *Grallaria* représentent un tout autre élément faunique que les précédents : ce sont des espèces purement andines, propres aux forêts de la zone tempérée des montagnes. Toutes trois sont d'ailleurs communes, en Colombie et en Équateur.

Grallaria squamigera Prév. et Des Murs. — 2 ♂, 1 ♀ ad. : Cerro Mojanda; Aluguincho.

Grallaria quitensis Less. — 2 ♂, 2 ♀ ad. : Cerro Mojanda; Aluguincho.

Grallaria ruficapilla Lafr. — 2 ♂, 1 ♀ ad. : Cerro Mojanda; Aluguincho.

Furnariidés.

Cinclodes fuscus albidiventer Scl.; — ♂ et ♀ ad. : Cerro Mojanda.

Race particulière aux montagnes de l'Équateur.

Cinclodes excelsior Scl. (= *Upucerthia exc.*, auct.). — ♂ et ♀ ad. : Cerro Mojanda.

Espèce propre également à l'Équateur et au sud de la Colombie. Il est impossible d'imaginer une similitude de plumage plus marquée que celle qui existe entre cette espèce et la précédente, à tel point que l'on pourrait même concevoir des doutes sur leur différence spécifique réelle : lorsque les différents âges de l'une et de l'autre seront connus, sans doute pourra-t-on se montrer plus affirmatif à ce sujet. Contentons-nous de constater pour le moment que le *C. excelsior* ne diffère de l'autre que par ses proportions plus considérables et son bec plus fort, légèrement incurvé au sommet. Ce caractère ne saurait justifier en tout cas suffisamment la séparation générique que la plupart des auteurs ont admise pour ces deux

formes et nous nous rallions à l'idée primitive de Sclater en rangeant le *C. excelsior* parmi les *Cinclodes*, ainsi d'ailleurs que le suggère Hellmayr (*Cat. of Birds of Amer.*, IV, 1925, p. 51).

Dendrocolaptidés.

Leptasthenura andicola Scl. — 2 ♂, 1 ♀ ad. : Cerro Mojanda.

Espèce caractéristique des hautes altitudes de la Colombie et de l'Équateur.

Synallaxis gularis Lafr. — 4 ♂ : Aluguincho; Cerro Mojanda.

Nous nous rangeons à l'avis de Chapman qui considère la forme *Pichinchæ* décrite par Stone, de l'Équateur, identique avec la forme typique de Colombie. D'ailleurs les quatre spécimens signalés ici présentent quelques différences individuelles dans la teinte plus ou moins ocreúse du plumage, caractère auquel il ne faut pas attacher une importance exagérée.

Synallaxis Azarai media Chapm. (= *S. frontalis*, auct.). — 4 ♂, 1 ♀ ad. : Aluguincho; Cerro Mojanda; V. de San Pedro Fingo.

Asthenes (= *Siptornis*) *flammulata* (Jardine). — 2 ♂, 1 ♀ : Curubi; Cerro Mojanda.

Asthenes Wyatti æquatorialis (Chapm.). — ♂ ad. : Cerro Mojanda.

Margarornis squamigera perlata (Less.). — 4 ♂, 2 ♀ ad. ; Aluguincho; Cerro Mojanda; Huila; Papallacta.

Espèce très abondante dans le nord des Andes.

Premnoplex brunnescens (Sclat.). — ♂ et ♀ ad. : San José.

Pseudocolaptes Boissonneani (Lafr.). — ♂ ad. : Aluguincho.

Cet exemplaire est tout à fait identique aux spécimens typiques de Bogota; il ne saurait donc être référé à la race *Johnsoni* Lönnb. et Rond., de l'Équateur oriental, — race d'ailleurs fort peu différenciée.

Philydor ruficaudatus (Lafr. et d'Orb.). — 2 ♀ id. et imm. : San José.

A l'inverse des précédentes, cette espèce n'appartient pas à la faune andine, mais au contraire à la faune amazonienne, et elle est très répandue dans toute l'Amazonie jusqu'en Guyane et en Bolivie. Elle est bien caractérisée par la couleur de l'uropygium et des sus-caudales qui, chez l'adulte, sont colorés en brun olivâtre comme le dos — et non en roux comme les rectrices — et sont légèrement frangés de roux seulement chez l'immature.

Automolus infuscatus (Scl.). — ♂ ad. : Rio Suno.

Espèce typique du bassin amazonien; elle est bien caractérisée par la teinte brun olivâtre du dos, l'absence de traits supra-oculaires et le dessous du corps brun pâle, avec la gorge blanchâtre.

Automolus rubiginosus brunnescens nov. subsp. — ♂ ad. : Rio Suno.

Dessus de la tête brun terreux sombre, plus pâle vers les lores; tout le dessus du corps et des ailes du même brun de terre faiblement teinté de rougeâtre et passant au brun châtain sombre sur l'uropygium et les sus-caudales; rectrices brun châtain sombre et terne en dessus, un peu plus pâle en dessous. Côtés de la tête bruns; menton blanchâtre, passant au fauve pâle sur la gorge et au roux fauve assez foncé sur les côtés et le bas de la gorge, puis au brun ochracé sur la poitrine et les flancs, avec tout le milieu de l'abdomen et les sous-caudales d'un ochracé plus pâle. Bordures internes des rémiges primaires roux cannelle pâle; sous-alaires et axillaires roux fauve assez vif.

Bec couleur de corne, avec la mandibule inférieure pâle.

Long. totale : 190 mm.; — aile : 80 mm.; — queue : 76 mm.; — bec : 19 mm.; — tarse ; 22 mm.

Cet Oiseau est évidemment celui que Chapman, dans sa revision des Oiseaux de l'Équateur (*B. L. in Ecuador,* 1926, p. 446) mentionne sous le nom d'*Aut. cinnamomeigula,* Hellm.; ce n'est toutefois qu'une forme de l'*A. rubiginosus,* espèce polymorphe bien caractérisée par la teinte rousse de la gorge et l'absence de traits supraoculaires et qui, jusqu'à Chapman, n'avait pas été signalée en Équateur. C'est ainsi un trait d'union tout naturel entre les races des pays voisins, décrites par Hellmayr : *A. r. cinnamomeigula*, de Colombie, et *A. r. Watkinsi,* du Pérou. Notre spécimen leur ressemble d'ailleurs par ses teintes générales beaucoup plus brunes et moins rougeâtres que chez les races de l'Amérique centrale; mais — autant que des caractères puissent être jugés définitivement d'après ce seul exemplaire et en l'absence des types voisins — il paraît s'en distinguer suffisamment pour justifier sa séparation subspécifique; entre autres par sa gorge plus pâle et par ses proportions sensiblement plus faibles, son bec court surtout, qui le rapprochent au contraire de la race guyanaise, *A. r. obscurus* Pelz. Peut-être, lorsque ces quatre races seront mieux connues, reconnaîtra-t-on qu'elles n'en constituent en réalité qu'une seule, propre au bassin de l'Amazone.

Quoi qu'il en soit, l'exemplaire que nous signalons ici se caractérise essentiellement par ses proportions assez grêles et ses teintes sombres, aussi bien la couleur brune du corps que la couleur châtain de l'uropygium et de la queue.

Hyloctistes subulatus (Spix) (=*Automolus sub.*, auct.). — ♂ ad. : San José.

Propre également à la faune du Haut-Amazone.

Lepidocolaptes lacrymiger æquatorialis (Mgx.). — ♂ ad. : Pilon.

Xiphocolaptes promeropirhynchus (Less.). — ♀ ad. : Aluguincho.

Tyrannidés.

Cette famille, une des plus considérables de l'avifaune américaine, est abondamment représentée en Équateur, mais, à part les *Agriornis* et formes voisines, d'origine plutôt patagonienne, la plupart des espèces signalées ici appartiennent à des types largement distribués dans les Andes septentrionales, de la Colombie à la Bolivie.

Agriornis montana solitaria Scl. — 2 ♂, 2 ♀ ad. : Pilon; Cerro Mojanda; Aluguincho.

Race nord-andine, adaptée aux hautes altitudes, d'une espèce plutôt méridionale.

Agriornis albicanda (Phil. et Landb.) [= *A. pollens*, auct.]. — 2 ♂ ad. : V. de San Pedro Tingo.

Cette espèce, de taille supérieure à la précédente, paraît habiter la zone tempérée moyenne des Andes, de l'Équateur à l'Argentine.

Muscisaxicola alpina (Jard.). — 2 ♂, 2 ♀ ad. : Cerro Mojanda.

Propre aux hautes altitudes des Andes du Nord.

Muscisaxicola maculirostris rufescens Berl. et Tacz. — ♂ et ♀ ad. : V. de Tumbaco.

Race particulière aux Andes de l'Équateur.

Myiotheretes striaticollis (Scl.). — 4 ♂, 1 ♀ ad. : Aluguincho; V. de Tumbaco.

Ochthœca fumicolor brunneifrons Berl. et Stolzm. — ♂ et ♀ ad. : Pilon; Cerro Mojanda.

Ochthœca rufopectoralis rufipectus (Less.) [= *O. Lessoni* auct.]. — 3 ♂, 1 ♀ ad. : Aluguincho; Curubi.

Ochtœca diadema gratiosa (Scl.). — 4 ♂ ad. : Aluguincho.

Sayornis nigricans latirostris (Cab. et Heine). — ♂ et ♀ ad. : V. de Tumbaco.

Colonia (= *Copurus*) *colonus* (Vieill.). — ♂ ad. : San José.

Espèce très répandue en Amérique du Sud; la variété *fuscicapilla* (Scl.), du nord des Andes, nous paraît tout à fait insignifiante.

Pyrocephalus rubinus obscurus Gould. — ♂ et ♀ ad. : V. de Tumbaco.

Cette race, propre au versant Pacifique des Andes et assez mal caractérisée, comme la plupart des races de cette espèce, nous semble du moins suffisamment distincte par la teinte sombre du dos chez le ♂.

(*A suivre.*)